

## Referenser

1. Svenska psykiatriska föreningen. ECT - Kliniska riktlinjer för elektrokonvulsiv behandling. Svensk psykiatri. Nr 15. Stockholm: Svenska psykiatriska föreningen, Gothia Fortbildning; 2014.
2. Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2010. Örebro: Örebro län landsting; 2011
3. Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2017. Örebro: Region Örebro län; 2018
4. Socialstyrelsen. Minnesstörningar hos patienter som behandlats med ECT - Om information och delaktighet för patienter och närtstående. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016.
5. Brus O, Cao Y, Gustafsson E, Hultén M, Landén M, Lundberg J, Nordanskog P, Nordenskjöld A. Self-assessed remission rates after electroconvulsive therapy of depressive disorders. European Psychiatry 2017;45:156-160.
6. Brus O, Nordanskog P, Båve U, Cao Y, Hammar Å, Landén M, Lundberg J, Nordenskjöld A. Subjective Memory Immediately Following Electroconvulsive Therapy. J ECT. 2017;33(2): 96-103.
7. Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2016. Örebro: Region Örebro län; 2017
8. Popolek K, Brus O, Elvin T, Landén M, Lundberg J, Nordanskog P, Nordenskjöld A. Rehospitalization and suicide following electroconvulsive therapy for bipolar depression—A population-based register study. J Affective Disorders. 2018;226:146-154.
9. Brus O, Cao Y, Hammar Å, Landén M, Lundberg J, Nordanskog P, Nordenskjöld A. A cohort study of time to readmission and time to suicide after electroconvulsive therapy for unipolar depression. Submitted.
10. Fröbert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, Omerovic E, Gudnason T, Maeng M, et al; TASTE Trial. Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013; 24;369(17):1587-97.