

Svarsjournal

Publikationsnamn	Internremiss Vårdförlopp depression
Namn	Anonym
Datum	2022-11-04 13:06:24
Respondent	SPF Svenska psykiatriska föreningen
Om depression (1.2)	Saknar text om agiterad depression samt irritabilitet. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2004.06.018
Omfattning (1.2)	inga kommentarer
Vårdförloppets mål (1.3)	Barnperspektivet bör också tas i beaktande. Bakom varje deprimerad förälder finns också barn som behöver uppmärksamhet, information och förståelse.
Ingång och utgång (1.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Somatisering vid depression bör lyftas fram mer. - "Utgång ur påbörjat vårdförlopp kan ske på något av följande sätt: " Här borde "kan" ändras till "skall". Så länge det inte finns starkare struktur för god utgång så kommer detta bagatelliseras eller blir nedprioriterat i en stressad sjukvård.
Flödesschemat för vårdförloppet (1.5)	inga kommentarer
Vårdförloppets åtgärder (1.6) - A	<ul style="list-style-type: none"> - saknar även här symptom på agiterad depression - tillägg till "Frågor att ställa": har du slutat göra aktiviteter som du normalt orkar utföra?
Vårdförloppets åtgärder (1.6) - H	Här bör differentialdiagnostik övervägas när depressionen inte "läker ut". Det bör utredas djupare således.
Vårdförloppets åtgärder (1.6) - M	Här skall det vara obligat med uppföljning och omprövning om läkemedel/antidepressiva verkligen har sin fulla indikation fortfarande.
Vårdförloppets åtgärder (1.6) - O	Här bör framgå vilka psyosociala stressorer som

	<p>redan finns och som också kan finnas som förväntansångest inför framtida livsförändringar hos patienten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bipolära eller anamnes på bipolaritet eller flera suicid i släkten skall medföra prioritering av remissen.
Indikatorer för uppföljning (2.2)	<p>Tillägg av indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - andel patienter som fått sitt nyinsatta antidepressivum utvärderat huruvida indikationen kvarstår efter depression i remission.
Övriga kommentarer på vårdförlopp depression för vuxna	<p>Det bör framgå vikten av att ompröva huruvida insatt psykofarmaka fortfarande behåller sin indikation. Detta gäller såväl antidepressiva som hypnotika.</p> <p>Sammanställning av svar från Cave Sinai, specialist i vuxenpsykiatri</p>